

## NUOVI AVVISTAMENTI

Silvano TOSO

Istituto di Zoologia  
Università di Milano  
Via Celoria 10 - MILANO

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentali per l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o fuori dai periodi di usuale fenologia.

Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione, l'esistenza di documentazione fotografica.

Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi degli osservatori.

SVASSO CORNUTO, *Podiceps auritus*: 2 individui osservati il 14 maggio 1980, Lago dei Monaci, Parco Nazionale del Circeo (Latina), (F. Fraticelli). Si tratta di specie di comparsa rara e irregolare segnalato sino ad ora poco più di cinquanta volte.

SVASSO COLLOROSSO, *Podiceps grisegena*: 1 individuo avvistato nella stessa data e luogo della specie precedente (F. Fraticelli). Benchè più frequente e regolare dello Svasso cornuto durante i passi le osservazioni invernali di questa specie nelle acque interne sono degne di attenzione.

SULA, *Sula bassana*: 10 individui (5 adulti, 1 immaturo del 1° anno e 4 in abiti intermedi) avvistati a Capo Murru di Porco (Siracusa) il 19 gennaio 1980 (C. Iapichino). La segnalazione conferma una presenza sempre più frequente durante l'inverno in particolare nelle acque costiere siciliane e sarde.

MARANGONE DAL CIUFFO, *Phalacrocorax aristotilis*: 1 individuo immaturo osservato a Capo Murru di Porco (Siracusa) il 5 e 8 luglio 1980 (S. Baglieri e C. Iapichino). Si tratta della prima osservazione nota per il Siracusano.

NITTICORA, *Nycticorax nycticorax*: due piccoli gruppi svernanti lungo il Ticino: 9 individui (4 adulti e 5 in abito del I° anno) osservati ripetutamente in località Ticino, comune di Torre d'Isola (Pavia) nei mesi di dicembre 1980 e gennaio 1981 (M. Fasola e F. Barbieri) e 2 individui (1 adulto e 1 giovane del I° anno) in località Villareale, Cassolnovo (Pavia) il 9 gennaio 1981 (C. Prigionì). Queste notizie riconfermano lo sporadico svenamento di questa specie nella Valle Padana.

AIRONE ROSSO, *Ardea purpurea*: 1 individuo segnalato in località Cascina Gaviola, Zerbolò (Pavia) il 4 febbraio 1981 (C. Cesaris). Si tratta di una delle poche osservazioni invernali di questo ardeide sino ad ora effettuate nell'Italia settentrionale.

FENICOTTERO, *Phoenicopterus ruber*: 2 individui adulti si sono trattieneuti dal 6 al 20 gennaio 1980 nell'oasi di Vendicari (Siracusa); nello stesso luogo 4 individui erano stati osservati nel novembre 1979 (C. Iapichino, S. Baglieri e F. Scelsi). Si tratta dei primi dati invernali sul Fenicottero in Sicilia.

AQUILA ANATRAIA MAGGIORE, *Aquila clanga*: 1 individuo adulto osservato il 29 settembre 1980 sui Pantani dell'Inferno, Parco Nazionale del Circeo (Latina) (F. Fraticelli). Questa specie è di passo molto scarso e irregolare e la sua frequenza sembra essere diminuita ulteriormente negli ultimi anni.

BIANCONE, *Circaëtus gallicus*: 2 individui osservati nella zona di Bosa (Nuoro) il 26 maggio 1980 (P. Brichetti). L'osservazione è tardiva rispetto al normale periodo di migrazione ed è stata effettuata in una zona della Sardegna dove la nidificazione di questa specie è data come possibile.

ALBANELLA MINORE, *Circus pygargus*: 1 maschio osservato il 25 maggio 1980 su uno stagno dell'Oristanese (P. Brichetti). Si tratta di una conferma della presenza di questa specie in periodo riproduttivo negli ambienti umidi della Sardegna centro-occidentale ove è data come nidificante con pochissime coppie.

FALCO DI PALUDE, *Circus aeruginosus*: 4 individui presenti alla foce del Simeto (Catania) nel gennaio 1980 (C. Iapichino). Insieme ad altre osservazioni effettuate dallo stesso Osservatore questo dato indica uno svernamento relativamente regolare di questa albanella nella Sicilia sud-orientale ove la sua nidificazione è possibile ma non accertata.

PIOVANELLO MAGGIORE, *Calidris canutus*: 1 individuo in abito incompleto osservato il 23 maggio 1980 nell'oasi di Vendicari (Siracusa) (C. Iapichino). Si tratta di una osservazione decisamente tardiva di questa specie caratterizzata comunque da una presenza scarsa e poco regolare durante i passi.

TOTANO MORO, *Tringa erythropus*: 5 individui osservati dalla metà di novembre 1979 all'8 marzo 1980 alla foce del Simeto (Catania) (C. Iapichino). Si tratta del primo avvistamento noto per la Sicilia.

PITTIMA MINORE, *Limosa lapponica*: 1 individuo osservato ripetutamente dall'11 al 14 settembre 1980 a Viareggio (Lucca) (N. Baccetti); due osservazioni di un singolo individuo il 28 settembre e il 28 novembre 1980 nella oasi di Vendicari (Siracusa) (S. Baglieri e C. Iapichino). Questa specie è considerata di passo raro e poco regolare.

STERCORARIO MAGGIORE, *Stercorarius skua*: 1 individuo adulto avvistato il 19 marzo 1980 a Capo Murru di Porco (Siracusa) (C. Iapichino, F. Mirabella e F. Scelsi). Questa specie a distribuzione nordica è di comparsa assai rara e irregolare nei mari italiani.

GABBIANO CORSO, *Larus audouinii*: ripetute osservazioni anche di 20 individui con temporaneamente (2 adulti, 8 immaturi del II° anno e 10 con piumaggio intermedio) nei mesi di luglio e agosto 1980 alle Saline di Priolo (Siracusa) (C. Iapichino). Viene confermata la estivazione regolare di questa specie nella Sicilia orientale.

TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE, *Streptopelia decaocto*: 3 individui osservati presso Cala Gonone (Nuoro) e alcuni individui nella zona di Arborea (Oristano) rispettivamente il 21 e 26 maggio 1980 (P. Brichetti). Si tratta delle prime osservazioni note di questa specie per la Sardegna.

PISPOLA, *Anthus pratensis*: 1 individuo adulto osservato il 6 luglio 1980 a Pontedilegno (Brescia) a circa 1800 m s.l.m. (P. Brichetti). Questa specie è solo saltuariamente estivante e da confermare come nidificante per l'arco alpino.

CUTRETTOLA, *Motacilla flava*: 2 osservazioni di individui appartenenti a forme di comparsa rara e irregolare: 1 maschio in abito di *M. f. beéna* il 4 aprile 1980 nel Parco Uccelli La Selva, Paliano (Frosinone) e 1 maschio ancora in abito *M. f. flavissima* il 29 settembre 1980 ai Pantani dello Inferno, Parco Nazionale del Circeo (Latina) (F. Fraticelli).

GRACCHIO CORALLINO, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*: 1 individuo giovane imbrancato con 150-200 Gracchi alpini *P. graculus* avvistato ripetutamente il 5 gennaio 1981 presso il Passo del Tonale (Brescia) (P. Brichetti). Da tempo la specie non veniva più segnalata per il settore centrale delle Alpi.

BALIA NERA, *Ficedula hypoleuca*: 1 femmina osservata il 31 luglio 1980 a Pontedilegno (Brescia) (P. Brichetti). La segnalazione può riferirsi a un individuo già in migrazione, ma questa specie è anche data come formalmente nidificante nelle regioni alpine anche se le notizie recenti sono assai frammentarie.

CANAPINO MAGGIORE, *Hippolais icterina*: 4 o 5 individui osservati contemporaneamente il 31 luglio 1980 a Pontedilegno (Brescia) (P. Brichetti). Questa presenza può essere spiegata con un passo anticipato, ma la specie è saltuariamente estivante e da confermare come nidificante sull'arco alpino.

STERPAZZOLA, *Sylvia communis*: 1 maschio osservato in canto il 25 maggio 1980 in una zona a macchia dell'Oristanese (P. Brichetti). Questa segnalazione merita ulteriori conferme poiché la nidificazione di questa specie in Sardegna è dubbia.