

### PRIMA NIDIFICAZIONE DELL'AVOCETTA, *Recurvirostra avocetta*, IN SICILIA

ABSTRACT. — *First breeding of the Avocet, Recurvirostra avocetta, in salt ponds in Western Sicily.*

L'Avocetta sembra che nel secolo scorso nidificasse saltuariamente nel Biviere di Lentini (Catania) e nelle Saline intorno Siracusa (DODERLEIN, 1869 - *Giorn. Sci. nat. econ.*, Palermo). Nessuna prova di nidificazione è però conosciuta in questo secolo. Gruppi di 4-10 individui vengono regolarmente osservati dal 1982, da marzo ad agosto, alle Saline di Trapani. Nel 1986 la specie è stata osservata per la prima volta anche in gennaio (16 individui) (Lo Valvo M. e Sarà M., osservazioni pers.). Durante i sopralluoghi effettuati alle Saline di Trapani nel corso della primavera del 1986 sono stati osservati 4 individui il 2/IV e 6 il 12/V che mostravano comportamento territoriale. Nelle visite successive effettuate dal 27/V al 10/VI questo gruppo di 4-6 individui mostrava il tipico comportamento territoriale di simulazione di ferite nei confronti del Gabbiano reale, *Larus cachinnans*, e degli osservatori. Il 19/VI durante una visita effettuata da Di Marca A., Iapichino C. e Sarà M., è stata accertata la nidificazione. Sono stati infatti osservati 3 giovani di Avocetta seguiti da 2 adulti che allarmavano ancora nei confronti del Gabbiano comune, *Larus ridibundus*, e degli osservatori mentre altri 3 individui adulti mostravano un comportamento indifferente.

Via Alba 20, Casa Santa, 91100 Trapani.

SALVATORE SURDO