

BM / 1172

ANDREA CIACCIO (*) & MAURIZIO SIRACUSA (**)

INTERESSANTI OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE
ALLA FOCE DEL SIMETO (CATANIA, SICILIA)

Riassunto. — Tra le osservazioni effettuate alla foce del fiume Simeto nella piana di Catania, in Sicilia, riguardanti 11 specie di uccelli poco comuni o rari in Sicilia ed in Italia, di particolare interesse sono gli svernamenti del Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*) e dello Zigolo della neve (*Plectrophenax nivalis*).

Abstract. — *Interesting ornithological observations at the Simeto rivermouth, in Sicily.*

A brief account of 11 rare species of birds watched at the Simeto rivermouth, in Sicily. Of particular interest the wintering of the White-headed Duck (*Oxyura leucocephala*) and of the Snow Bunting (*Plectrophenax nivalis*).

Il comprensorio palustre della foce del Simeto, oasi di protezione dal 1975, malgrado la notevole antropizzazione e conseguente degradazione di molte sue parti, riveste ancora un notevole interesse naturalistico ed ornitologico in particolare. Sull'area in esame è apparsa, sempre su questa Rivista, una nota di PRIOLO (1974). Abbiamo effettuato regolari osservazioni dal novembre 1979 all'aprile 1982 per un totale di oltre 70 escursioni della durata media di 4 ore. Sono stati usati per le osservazioni binocoli 10 × 40 e 12 × 50, inoltre per la documentazione fotografica reflex 35 mm fornita di teleobiettivo a lenti di 300 mm e duplicatore di focale. Le osservazioni più interessanti riguardano principalmente l'avifauna migratoria e svernante. Riportiamo 11 specie tra le oltre 150 da noi osservate alla foce del Simeto.

Svasso cornuto (*Podiceps auritus*). Un individuo il 3-II-1981 imbrancato con 4 Svassi piccoli (*Podiceps nigricollis*), da cui poteva essere distinto con facilità. Conosciamo solo altre due osservazioni per la Sicilia (MASSA et al. 1979).

(*) Via Enna 15 A, 95128 Catania; (**) Corso S. Vito 174 C/9, 95030 Mascalucia (Catania).

Fistione turco (*Netta rufina*). Due individui ♂ e ♀ nel novembre 1979. Un tempo nidificante in Sicilia e poco comune come invernale (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929). CRAMP & SIMMONS (1977) lo riportano come accidentale per la Sicilia; da notizie assunte presso osservatori si dedurrebbe una certa regolarità: ♀ catturata a Pachino (Sr) nel novembre 1976, in compagnia di un altro individuo; ♂ adulto catturato alle saline di Trapani nel novembre 1975 (B. Massa com. pers.); ♂ osservato a Vendicari (Sr) l'8-XI-1979 (C. Iapichino com. pers.); ♀ catturata alla foce del Tellaro (Sr) l'11-XI-1981 (S. Baglieri com. pers.).

Quattrocchi (*Bucephala clangula*). Una ♀ nei seguenti giorni: 8-10-13-17-XII-1981. Specie ritenuta molto rara od accidentale nel basso Mediterraneo (HEIM DE BALSAC & MAYAUD 1962, MASSA 1976, SULTANA & GAUCI 1982). Le ultime segnalazioni per la Sicilia risalgono al 1930 (SORCI et al. 1973).

Smergo maggiore (*Mergus merganser*). Il 16-XI-1980 3 ♀♀ ed un'altra ♀ notata con dubbio tra 4 Smerghi minori (*Mergus serrator*) il 26-XI-1981. I movimenti di questa specie sembrano interessare soprattutto l'Italia settentrionale (MASSA 1976, CRAMP & SIMMONS 1977, SULTANA & GAUCI 1982). Altri dati: cattura di un ♂ alla foce dell'Anapo (Sr) l'8-XI-1955 (FAGOTTO & BAGLIERI 1976).

Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*). Osservate due ♀♀ o giovani dal 6-XII-1981 al 3-I-1982, che documentano lo svernamento della specie in Sicilia. Anatra fortemente diminuita nel suo areale mediterraneo (CRAMP & SIMMONS 1977), un tempo comune in Sicilia come invernale (ZUCCARELLO & PATTI in DODERLEIN 1869-1874: pp. 269), oggi ritenuta accidentale (MASSA 1976). Altri dati: ♀ catturata presso la foce dell'Anapo (Sr) il 9-XI-1970 (FAGOTTO & BAGLIERI 1976), 2 es. nel novembre 1974 presso Pachino (Sr) (Baglieri com. pers.).

Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*). Un individuo l'1-II-1981. Dalla documentazione fotografica risulta possibile osservare i seguenti caratteri diagnostici: copritrici sottoalari bruno scure o nerastre e remiganti grigio pallido in contrapposizione alle copritrici sottoalari bruno nerastre e remiganti bruno scure della Aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*). Inoltre è ben visibile una cospicua zona bianca alla base delle remiganti esterne che forma un'ampia fascia. Altra osservazione (lo stesso individuo?) il 25-II-1981. Specie ritenuta irregolare in Sicilia: sono note meno di 10 segnalazioni (MASSA 1976); mai notificata per Malta (SULTANA & GAUCI 1982).


Aquila minore (*Hieraetus pennatus*). Un individuo nell'ottobre 1979. Esso presentava parti superiori color nocciola scuro con ben visibili strie scure corrispondenti alle copritrici secondarie e ben visibili spalline chiare e spazio sopracaudale bianco (PORTER et al. 1978). Specie regolare a Capo

Bon nella migrazione primaverile (THIOLLAY 1977; DEJONGHE 1980), ma poco notata in Sicilia (MASSA et al. 1979). SULTANA & GAUCI (1982) la ritengono irregolare ed erratica per Malta. Altri dati recenti a noi noti: ♂ adulto osservato nella prima decade del 1978 (S. Baglieri com. pers.); 25-XII-1979 1 es. a Chiaromonte Gulfi (Rg) (S. Baglieri com. pers.); 1 es. il 4-X-1980 ai pantanelli di Siracusa (S. Baglieri com. pers.).

Piro-piro terek (*Xenus cinereus*). Un individuo il 10-V-1981 in compagnia di un Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*) e di un Piovanello (*Calidris ferruginea*), che sono rimasti sul posto al momento del suo involo. Altri dati recenti per la Sicilia: 1 es. catturato al pantano Morghello (Sr) il 28-VIII-1979 (S. Baglieri com. pers.); MASSA et al. (1979), MASSA (1978). Citato due sole volte per Malta (SULTANA & GAUCI 1982).

Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*). Un individuo il 26-XII-1981. Dato interessante per la data di avvistamento e per il fatto che l'uccello sembrava rivestire l'abito nuziale completo. La specie è già stata trovata in Tunisia durante l'inverno (WHITAKER in HEIM DE BALSAC & MAYAUD 1962); MESS (1979) scrive che un piccolo numero di Mignattini piombati sverna nel Mediterraneo.

Rondine di mare maggiore (*Hydroprogne tschegrava*). Osservato un individuo il 25-II-1981. Si tratterebbe della seconda segnalazione invernale per questa specie, in Sicilia: 4 individui il 4-I-1978 (MASSA 1978).



Piro-piro terek con Piro-piro boschereccio e Piovanello; foce del Simeto 10-V-1981.
(Foto A. Ciaccio)

Non si conoscono dati per dicembre. Specie di passo, non rara in primavera e molto frequente in autunno (PRIOLO 1974; BAGLIERI & FAGOTTO 1977).

Zigolo delle nevi (*Plectrophenax nivalis*). Uno il 29-XI-1981 (A. Priolo com. pers.), 3 l'8-XII-1981 (S. Baglieri com. pers.), 5 il 17-XIII-1981, 4 il 24-XII-1981, 4 il 10-I-1982. Le osservazioni attestano lo svernamento della specie alla foce del Simeto; a riguardo non conosciamo altre segnalazioni. Altri dati a noi noti: 1 individuo il 17-I-1981 a Capo Murro di Porco (Sr) (IAPICHINO in TOSO 1981). Specie di passo regolare ma scarso in Sicilia (MASSA et al. 1979).

Ringraziamenti. — Un ringraziamento particolare a Bruno Massa ed Angelo Priolo che ci hanno notevolmente aiutati nella compilazione di questa nota, ed a Salvatore Baglieri e Carmelo Iapichino che ci hanno gentilmente messo a disposizione alcune loro osservazioni.

BIBLIOGRAFIA

- BAGLIERI S. & FAGOTTO F., 1977 - La Rondine di mare maggiore *Hydroprogne tschegrava* (Lepechin) nella Sicilia orientale - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 47: 229-234.
- CRAMP S. & SIMMONS K. E. L. (ed.), 1977 - The Birds of the Western Palearctic, Vol. I - *Oxford University Press*, Oxford, London, New York, 722 pp., 108 tavv.
- DEJONGHE J. F., 1980 - Analyse de la migration prenuptiale des rapaces et des cigognes au Cap Bon (Tunisie) - *Oiseau et Rev. fr. Orn.*, Paris, 50: 125-147.
- DODERLEIN P., 1869-1874 - Avifauna del Modenese e della Sicilia - *Gior. Sc. nat. econ.*, Palermo, 5: 1-317 + 318-381 (aggiunte).
- FAGOTTO F. & BAGLIERI S., 1976 - Ornitofauna delle saline di Siracusa - *Animalia*, Catania, 3: 81-103.
- HEIM DE BALSAC H. & MAYAUD N., 1962 - Les oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique - *Lechevalier ed.*, Paris, 486 pp.
- MASSA B., 1976 - Considerazioni sulla situazione della avifauna Siciliana. Problemi di conservazione - *Ricerche biol. Selvaggina*, Bologna, 7 (suppl.): 427-474.
- MASSA B., 1978 - Studio dei Laro-Limicoli di Sicilia (*Aves*, *Charadriiformes*) - Ambienti umidi costieri, *Atti II Conv. sicil. Ecol.*, Delphinus ed. Augusta, 4: 71-114.
- MASSA B., BAGLIERI S. & CANGIALOSI G., 1979 - Nouvelles données pour l'étude des migrations à travers la Méditerranée centrale - *Alauda*, Paris, 47: 17-27.
- MEEUS G. F., 1979 - Verspreiding en Getalssterkte van de Witwangstern, *Chlidonias hybrida* (Pallas), in Europa en Noord-Afrika - *Zool. Bijdragen*, Leiden, 26: 1-63.
- PRIOLO A., 1974 - Osservazioni alla foce del Simeto presso Catania (1972-1973) - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 44: 43-52.
- PORTER R. F., WILLIS I., CHRISTENSEN S. & NIELSEN B. P., 1978 - Flight identification of European Raptors - *T. & H. D. Poyser*, Berkhamsted, 184 pp. e 80 tavv.
- SORCI G., MASSA B., CANGIALOSI G., 1973 - Avifauna delle isole Egadi con notizie riguardanti quella della provincia di Trapani (Sicilia) - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 43: 1-119.
- SULTANA J. & GAUCI C., 1982 - A new guide to the birds of Malta - *The Ornithological Society*, Valletta, 207 pp.
- THIOLLAY J. M., 1977 - Importance des populations des rapaces migrateurs au Méditerranée occidentale - *Alauda*, Paris, 45: 115-121.
- TOSO S., 1981 - Nuovi avvistamenti - *Avocetta*, Parma, 5: 103-106.