

Danilo Graffeo, Antonino Barbera,
Salvatore Surdo & Bruno Massa

GLI UCCELLI DEL MUSEO ORNITOLOGICO DI MAZARA DEL VALLO

Note metodologiche. Le informazioni, quali preparatori, donatori, date, località di cattura, sesso (se seguito subito da altri dati relativi alla cattura), riportate nella lista sono tratte dalle targhette originarie o dai supporti su cui sono stati montati gli esemplari. La sistematica di riferimento è quella usata da Baccetti et al. (2021); per quanto riguarda i taxa non presenti in quest'ultima lista, è stato seguito, invece, il lavoro di HBW & BirdLife International (2020). Inoltre, nel caso di due dei *Passer*, è stata adottata la denominazione proposta da Massa et al. (2022), ovvero *Passer italiae x hispaniolensis*.

Lista sistematica dei taxa presenti nel museo

GALLIFORMES

Odontophoridae

Colino della Virginia *Colinus virginianus*, Northern
Bobwhite
2 es.

Phasianidae

Quaglia *Coturnix coturnix*, Common Quail
4 es., di cui 2 pulli.

Coturnice *Alectoris graeca*, Rock Partridge

5 es., di cui almeno 4 appartenenti alla ssp. *Alectoris graeca whitakeri*. 1 ♂ è stato catturato nel 1951; un altro ♂ è stato catturato nel mese di ottobre (anno indefinito) e faceva parte della collezione conservata in precedenza nell'I.I.S.S. "Liceo G.G. Adria–G.P. Ballatore". Gli altri tre esemplari senza dati facevano parte della donazione Adragna.

Coturnice orientale *Alectoris chukar*, Chukar

1 es.

Pernice sarda *Alectoris barbara*, Barbary Partridge

3 es., di cui 1 catturato a Tunisi il 23.XI.1973 da Cola Sammartano.

Pernice rossa *Alectoris rufa*, Red-legged Partridge

1 es.

Gallina domestica *Gallus gallus* forma domestica,
Domestic Chicken

1 es.

Fagiano dorato *Chrysolophus pictus*, Golden Pheasant

1 es. ♂ probabilmente di cattività. Forse si tratta di un ibrido, derivante dall'incrocio tra un Fagiano dorato e un Fagiano di Lady Amherst *Chrysolophus amherstiae*, Lady Amherst's Pheasant, per via del mantello nucale pressoché bianco anziché giallo-arancio.

Fagiano comune *Phasianus colchicus*, Common Pheasant

6 es., di cui 4 ♂♂, 1 ♀ e 1 di sesso indet.; uno dei ♂♂ appartiene alla varietà *tenebrosus*.

Starna *Perdix perdix*, Grey Partridge

5 es. Secondo le targhette originarie, tra questi ci sarebbero almeno 2 ♂♂ e 1 ♀: 1 ♂ è stato catturato il 7.IV.1932 ed è stato preparato da Saverio Mauro.

Starna asiatica *Perdix dauurica*, Daurian Partridge

1 es. Sulla targhetta originaria è scritto che si tratta di un ♂.

Tetraone mantellato *Bonasa umbellus*, Ruffed Grouse

1 es.

Pernice bianca nordica *Lagopus lagopus*, Willow Grouse

2 es., di cui 1 in abito inv. e 1 in abito estivo.

Pernice bianca di Scozia *Lagopus lagopus scotica*, Red Grouse

1 es.

Fagiano di monte *Lyrurus tetrix*, Black Grouse

3 es., di cui 2 ♂♂ e 1 ♀.

ANSERIFORMES

Anatidae

Dendrocigna facciabianca *Dendrocygna viduata*, White-faced Whistling-duck

1 es. probabilmente di cattività.

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*, Ruddy Duck

1 es.

Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala*, White-headed Duck

1 es. ♂ adulto catturato intorno al 1930 in loc. Nivolelli, presso Mazara (Sorci et al. 1973). Nel secolo scorso era migratrice invernale, poco comune; oggi è accidentale in Sicilia.

Cigno reale *Cygnus olor*, Mute Swan

2 es. immaturi catturati localmente intorno al 1960 da Marco Alagna (Sorci et al. 1973; A. Burgio in verbis a B. Massa), per un refuso riportati come Cigni selvatici da Sorci et al. (1973).

Cigno minore *Cygnus columbianus*, Tundra Swan

1 es. adulto catturato alla foce del Simeto (Catania) nell'autunno 1952 da Marco Alagna (Sorci et al. 1973; A. Burgio in verbis a B. Massa).

Oca colorosso *Branta ruficollis*, Red-breasted Goose

1 es. probabilmente di cattività.

Oca del Canada *Branta canadensis*, Canada Goose

1 es. probabilmente di cattività.

Oca indiana *Anser indicus*, Bar-headed Goose

1 es. Si tratta probabilmente di un esemplare allevato in cattività, vista la presenza di un anello che non sembra compatibile con attività di studio.

Oca selvatica *Anser anser*, Greylag Goose

3 es.

Moretta codona *Clangula hyemalis*, Long-tailed Duck

1 es. extra-italiano.

Re degli edredoni *Somateria spectabilis*, King Eider
1 es. ♂ extra-italiano.

Edredone *Somateria mollissima*, Common Eider
2 es., di cui 1 ♀ catturata nel mare antistante Marsala, di fronte l'isola di Favignana, il 10.VII.1990 (al momento della cattura era insieme ad altri 6 esemplari; si tratta della prima segnalazione di questa specie per la Sicilia) (Lo Valvo & Massa 1999; Massa et al. 2015) e 1 ♂ extra-italiano entrato a far parte della collezione dopo la pubblicazione di Asaro (2003). L'Edredone è una specie accidentale in Sicilia (Massa et al. 2021).

Quattrocchi minore *Bucephala albeola*, Bufflehead
1 es. extra-italiano.

Quattrocchi *Bucephala clangula*, Common Goldeneye
2 es. ♂♂, di cui 1 catturato intorno al 1930 in loc. Nivolelli, presso Mazara (Sorci et al. 1973) e 1 extra-italiano entrato a far parte della collezione dopo la pubblicazione di Asaro (2003). Fino alla metà del secolo scorso era regolarmente presente in inverno in Sicilia; oggi è accidentale.

Pesciaiola *Mergellus albellus*, Smew
1 es. extra-italiano.

Smergo maggiore *Mergus merganser*, Goosander
1 es.

Smergo minore *Mergus serrator*, Red-breasted Merganser
2 es.

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*, Egyptian Goose

2 es. probabilmente di cattività.

Volpoca *Tadorna tadorna*, Common Shelduck

7 es., di cui 1 ♀ catturata il 10.I.1950. Un altro esemplare è stato preparato da Marascia.

Casarca *Tadorna ferruginea*, Ruddy Shelduck

1 es. probabilmente di cattività.

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*, Ringed Teal

1 es. extra-italiano.

Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*,
Marbled Teal

1 es. extra-italiano.

Fistione turco *Netta rufina*, Red-crested Pochard

4 es., di cui 3 ♂♂ (tra cui 1 catturato nel 1953) e 1 ♀ catturata il 3.I.1935 e preparata da Saverio Mauro. Sorci et al. (1973) riportano solo 2 esemplari, ovvero la ♀ e il ♂ di cui è noto l'anno di cattura.

Moriglione *Aythya ferina*, Common Pochard

6 es., di cui 5 ♂♂ e 1 di sesso indet. 1 ♂ (sulla targhetta originaria è riportato erroneamente come ♀) è stato catturato nel dicembre 1953.

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, Ferruginous Duck

5 es.

Moretta *Aythya fuligula*, Tufted Duck

4 es., di cui 3 ♂♂ e 1 di sesso indet.

Alzavola dell'Amazzonia *Amazonetta brasiliensis*,
Brazilian Teal

1 es. probabilmente di cattività.

Marzaiola *Spatula querquedula*, Garganey

10 es., di cui 6 ♂♂ e 4 di sesso indet. Sulla targhetta originaria di uno di questi ultimi è riportato il sesso (♀) e l'anno di cattura (1953); la targhetta di altri 3 esemplari (2 ♂♂ e 1 di sesso indet.) indica che sono stati catturati nel 1979 e che sono stati donati da Marcello Sicurella.

Mestolone sudamericano *Spatula platalea*, Red Shoveler

1 es. probabilmente di cattività.

Mestolone *Spatula clypeata*, Northern Shoveler

5 es., di cui 2 ♂♂ e 3 ♀♀. La targhetta originaria di 1 ♂ riporta il sesso e l'anno di cattura (1948).

Marzaiola americana *Spatula discors*, Blue-winged Teal

1 es. probabilmente di cattività.

Canapiglia *Mareca strepera*, Gadwall

6 es., di cui 4 ♂♂ e 2 ♀♀; una di queste ultime ha una vecchia targhetta che indica il sesso (♀) e il preparatore (Giovanni Rallo).

Fischione *Mareca penelope*, Eurasian Wigeon

4 es., di cui 3 ♂♂ e 1 di sesso indet.

Fischione del Cile *Mareca sibilatrix*, Chiloe Wigeon

1 es. Si tratta probabilmente di un esemplare allevato in cattività, vista la presenza di un anello che non sembra compatibile con attività di studio.

Germano reale *Anas platyrhynchos*, Mallard

5 es., di cui 2 ♂♂ e 3 di sesso indet.

Codone delle Bahamas *Anas bahamensis*, White-cheeked Pintail

1 es. probabilmente di cattività.

Codone *Anas acuta*, Northern Pintail

5 es., di cui 4 ♂♂ e 1 ♀. Uno dei ♂♂ è stato catturato nel 1952. Sorci et al. (1973) riportano 3 esemplari, tra cui 2 (1 ♂ e la ♀) indicati in 'eclisse'.

Alzavola *Anas crecca*, Common Teal

4 es., di cui 3 ♂♂ e 1 di sesso indet. La targhetta originaria di 1 ♂ indica l'anno di cattura (1980).

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, Little Grebe

6 es.

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*, Great Crested Grebe

5 es.

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*, Black-necked Grebe

5 es.

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopterus roseus*, Greater Flamingo

3 es., di cui 1 catturato a Capo Feto (Asaro 2003).

COLUMBIFORMES

Columbidae

Piccione domestico *Columba livia* forma domestica,
Domestic Pigeon

6 es., di cui 1 con anello di allevatore maltese (Asaro
2003).

Colombaccio *Columba palumbus*, Eurasian Woodpigeon
2 es.

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*, European Turtle-
dove
5 es.

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*, Eurasian
Collared-dove
1 es.

Tortora delle palme *Spilopelia senegalensis*, Laughing
Dove
1 es. probabilmente proveniente dall'isola di Pantelleria,
dove si è stabilita da almeno venti anni.

Tortora alibronzate dal ciuffo *Ocyphaps lophotes*, Crested
Pigeon
1 es. probabilmente di cattività.

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Sirratte *Syrhaptes paradoxus*, Pallas's Sandgrouse
1 es. extra-italiano.

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, European Nightjar
3 es.

Succiacapre isabellino *Caprimulgus aegyptius*, Egyptian Nightjar

1 es. ♂ catturato nei dintorni di Mazara prima del 1955 (nella stagione primaverile) e preparato da Saverio Mauro; questa costituisce la quarta cattura per la Sicilia (Sorci et al. 1973). Il Succiacapre isabellino è una specie accidentale in Italia (Baccetti et al. 2021).

Apodidae

Rondone comune *Apus apus*, Common Swift
2 es.

CUCULIFORMES

Cuculidae

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*, Great Spotted Cuckoo

5 es., di cui 1 catturato da Giovanni Palermo in contrada Campana (Mazara) il 6.III.1968 e preparato da Marco Alagna (al momento della cattura era insieme a un altro esemplare) (Hopps (1968); località, data e autore della cattura confermati anche dalla targhetta originaria), e 1 catturato successivamente (Sorci et al. 1973); gli altri 3 esemplari sono entrati a far parte della collezione dopo la pubblicazione di Sorci et al. (1973).

Cuculo *Cuculus canorus*, Common Cuckoo

7 es.

GRUIFORMES

Rallidae

Porciglione *Rallus aquaticus*, Western Water Rail

5 es., di cui 1 ♀ catturata il 29.XI.1948.

Re di quaglie *Crex crex*, Corncrake

3 es.

Voltolino *Porzana porzana*, Spotted Crake

4 es.

Schiribilla grigiata *Zapornia pusilla*, Baillon's Crake

1 es.

Pollo sultano *Porphyrio porphyrio*, Purple Swamphen

3 es., di cui 1 ♂ catturato nell'aprile del 1949 e preparato da Saverio Mauro (questo faceva parte della collezione conservata in precedenza nell'I.I.S.S. "Liceo G.G. Adria-G.P. Ballatore"); un altro esemplare, che era l'unico a far parte della collezione del museo fino all'entrata del ♂ già citato (cfr. Sorci et al. (1973) e Asaro (2003)), proveniva dai laghetti di Preola (A. Burgio in verbis a B. Massa). L'ultimo esemplare entrato nel museo è di cattura extra-siciliana. Il Pollo sultano si era estinto in Sicilia dopo la metà del secolo scorso, ma è stato reintrodotta con successo negli anni 2000.

Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Common Moorhen

3 es., di cui 1 ♀ catturata il 18.IV.1949.

Folaga *Fulica atra*, Common Coot

4 es., di cui 1 ♂ catturato negli anni '40 (nel mese di novembre) e preparato da Saverio Mauro, e 1 affetto probabilmente da "diluizione" ("Dilution"; cfr. van Grouw 2021), riportato come affetto da "clorocroismo" da Sorci et al. (1973), i quali riportano anche la sola testa di un altro esemplare, la cui placca frontale di dimensioni anomale aveva un'escrescenza in cima alla fronte nascosta dal piumaggio, da essi ritenuto un caso teratologico. Questa testa di Folaga era presente ancora all'inizio degli anni 2000 (Asaro 2003), ma oggi risulta dispersa.

Gruidae

Gru *Grus grus*, Common Crane

2 es., di cui 1 adulto catturato in contrada Lippone (Asaro 2003) e 1 juv.

OTIDIFORMES

Otididae

Gallina prataiola *Tetrax tetrax*, Little Bustard

2 es., di cui 1 ♂ adulto in abito riproduttivo e 1 ♀; quest'ultima è stata catturata nel territorio di Mazara del Vallo (Silvio Manzo, com. pers.) ed era già stata riportata da Sorci et al. (1973), i quali segnalavano anche l'ala di un altro esemplare che è andata perduta già all'inizio degli anni 2000 (Asaro 2003). La ♀ e l'ala dispersa risalgono a prima del 1940 (A. Burgio in verbis a B. Massa). Il ♂, entrato a far parte della collezione del museo nel 2019, è probabilmente di cattura extra-siciliana. La Gallina prataiola era sedentaria in Sicilia fino alla seconda metà del secolo scorso, quando si è estinta.

GAVIIFORMES

Gaviidae

Strolaga mezzana *Gavia arctica*, Arctic Loon

1 es. immaturo, di sicura provenienza locale; questo esemplare al momento della cattura era assieme ad altri 2 (Sorci et al. 1973).

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

Uccello delle tempeste *Hydrobates pelagicus*, European Storm-petrel

4 es., di cui 2 con anello applicato nella colonia di Marettimo, catturati probabilmente nel mare del Trapanese. Sorci et al. (1973) riportano solo gli altri 2 esemplari, entrambi di provenienza locale. Sulla targhetta originaria di uno degli esemplari privi di anello è scritto che si tratta di un ♂.

Procellariidae

Berta maggiore *Calonectris diomedea*, Scopoli's Shearwater

1 es.

CICONIIFORMES

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*, Black Stork

2 es., di cui 1 immaturo, riportato da Sorci et al. (1973) come adulto, catturato negli anni '50 (A. Burgio in verbis a B. Massa).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*, White Stork

1 es. adulto, riportato da Sorci et al. (1973).

PELECANIFORMES

Threskiornithidae

Spatola *Platalea leucorodia*, Eurasian Spoonbill

1 es.

Mignattaio *Plegadis falcinellus*, Glossy Ibis

5 es., di cui 2 immaturi.

Ardeidae

Tarabuso *Botaurus stellaris*, Eurasian Bittern

5 es., di cui 1 ♀ catturata il 16.X.1936 e preparata da Saverio Mauro, entrata a far parte della collezione quando l'I.I.S.S. "Liceo G.G. Adria-G.P. Ballatore" donò i suoi esemplari all'Unione Cacciatori di Mazara del Vallo. Sorci et al. (1973) riportavano 1 solo esemplare di provenienza locale, gli altri (incluso quello del 1936) sono entrati successivamente.

Tarabusino *Ixobrychus minutus*, Common Little Bittern

5 es.

Nitticora *Nycticorax nycticorax*, Black-crowned Night-heron

11 es., di cui 8 adulti e 3 immaturi. Per quanto riguarda gli adulti, uno è stato preparato da Marascia, e un altro era stato donato da Marco Alagna.

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*, Squacco Heron
3 es.

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*, Cattle Egret
1 es.

Airone cenerino *Ardea cinerea*, Grey Heron
5 es.

Airone rosso *Ardea purpurea*, Purple Heron
5 es., di cui 2 immaturi.

Airone bianco maggiore *Ardea alba*, Great White Egret
1 es. catturato l'8.I.1950.

Garzetta *Egretta garzetta*, Little Egret
2 es.

Pelecanidae

Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus*, Great White Pelican
1 es. già facente parte della collezione conservata in precedenza nell'I.I.S.S. "Liceo G.G. Adria-G.P. Ballatore".

SULIFORMES

Sulidae

Sula *Morus bassanus*, Northern Gannet

4 es., di cui 1 juv. e 3 probabilmente adulti, di cui 1 catturato il 30.I.1950.

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo*, Great Cormorant
2 es., di cui 1 ♀ catturata il 30.IX.1932 e preparata da Saverio Mauro, e 1 con anello Vogelwarte Helgoland Germany 243157.

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

Occhione *Burhinus oedicnemus*, Eurasian Thick-knee
2 es.

Pluvianidae

Guardiano dei coccodrilli *Pluvianus aegyptius*, Egyptian Plover
1 es. extra-italiano.

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*, Eurasian Oystercatcher
1 es.

Recurvirostridae

Avocetta *Recurvirostra avocetta*, Pied Avocet
4 es.

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*, Black-winged Stilt

4 es. Sulla targhetta originaria di 1 esemplare è scritto che si tratta di un ♂.

Charadriidae

Pivieressa *Pluvialis squatarola*, Grey Plover

2 es., di cui 1 è stato preparato da Marascia.

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*, Eurasian Golden Plover

3 es.

Piviere tortolino *Eudromias morinellus*, Eurasian Dotterel

3 es.

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*, Common Ringed Plover

1 es.

Corriere piccolo *Charadrius dubius*, Little Ringed Plover

4 es.

Corriere vocifero *Charadrius vociferus*, Killdeer

1 es. extra-italiano.

Fratino *Charadrius alexandrinus*, Kentish Plover

2 es. 1 esemplare probabilmente venne riportato come Piovanello tridattilo *Calidris alba* da Sorci et al. (1973), sulla base di una vecchia targhetta ove è scritto "*Calidris arenaria*", sinonimo di *Calidris alba*.

Pavoncella *Vanellus vanellus*, Northern Lapwing

5 es.

Pavoncella armata *Vanellus spinosus*, Spur-winged
Lapwing
1 es. extra-italiano.

Scolopacidae

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*, Whimbrel
3 es., di cui 1 ♂ catturato nell'aprile del 1953.

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*, Eurasian Curlew
2 es.

Pittima reale *Limosa limosa*, Black-tailed Godwit
4 es.

Voltapietre *Arenaria interpres*, Ruddy Turnstone
3 es., di cui 1 ♂ catturato l'8.V.1935 e preparato da
Saverio Mauro.

Piovanello maggiore *Calidris canutus*, Red Knot
1 es.

Combattente *Calidris pugnax*, Ruff
10 es.

Piovanello comune *Calidris ferruginea*, Curlew Sandpiper
1 es.

Piovanello pancianera *Calidris alpina*, Dunlin
1 es.

Gambecchio comune *Calidris minuta*, Little Stint
1 es.

Beccaccia *Scolopax rusticola*, Eurasian Woodcock

4 es., di cui 1 affetto probabilmente da "leucismo parziale" ("partial Leucism"; cfr. van Grouw 2021), e 1 ♀ catturata il 29.XI.1948.

Croccolone *Gallinago media*, Great Snipe
2 es., di cui 1 ♀ catturata il 19.IV.1949.

Beccaccino *Gallinago gallinago*, Common Snipe
3 es.

Frullino *Lymnocyptes minimus*, Jack Snipe
2 es., di cui 1 ♀ catturata il 5.II.1950.

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*, Common Sandpiper
3 es.

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*, Green Sandpiper
2 es.

Totano moro *Tringa erythropus*, Spotted Redshank
3 es.

Pantana *Tringa nebularia*, Common Greenshank
1 es.

Pettegola *Tringa totanus*, Common Redshank
1 es.

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*, Wood Sandpiper
1 es.

Glareolidae

Corrione biondo *Cursorius cursor*, Cream-coloured Courser;

3 es., di cui 1 es. catturato nella primavera del 1956 a Capo Feto (al momento della cattura era insieme a un altro esemplare) (Sorci et al. 1973) e 2 es., anch'essi presi a Capo Feto (Asaro 2003), che sono entrati a far parte della collezione nel lasso di tempo tra la data di pubblicazione di Sorci et al. (1973) e quella di Asaro (2003).

Pernice di mare *Glareola pratincola*, Collared pratincole
3 es., di cui 1 immaturo.

Laridae

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*, Little Gull
1 es.

Gabbiano comune *Larus ridibundus*, Black-headed Gull
2 es.

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*,
Mediterranean Gull
1 es. immaturo, con anello Moskwa E510657.

Zafferano *Larus fuscus*, Lesser Black-backed Gull
1 es.

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*, European Herring Gull
1 es. al terzo inverno, catturato il 5.II.1950 (sulla targhetta originaria è indicato come "Larus argentatus [chachinnans]").

Gabbiano reale *Larus michahellis*, Yellow-legged Gull
3 es., di cui 1 pullus trovato su un molo del porto di Mazara (Sorci et al. 1973), 1 immaturo e 1 adulto.

Fratricello *Sternula albifrons*, Little Tern

3 es.

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*, Common Gull-billed Tern

4 es., di cui 1 immaturo e 3 probabilmente adulti. Sulle targhette di 2 possibili adulti è scritto che si tratta di ♂ ♂ (per uno di questi è indicata anche la data di cattura, 17.IV.1949).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*, White-winged Tern

1 es.

Mignattino comune *Chlidonias niger*, Black Tern

1 es.

Stercorariidae

Labbo *Stercorarius parasiticus*, Arctic Jaeger

2 es., di cui 1 immaturo catturato a 15 miglia a sud di Lampedusa il 3.III.1963 (Sorci et al. 1973); Moltoni (1970), Sorci et al. (1971) e Massa et al. (2015) indicavano in modo impreciso la cattura a 12 miglia a sud di Lampedusa il 1.III.1963). L'altro esemplare (forse un adulto) è probabilmente di cattura extra-italiana.

Stercorario maggiore *Catharacta skua*, Great Skua

1 es. catturato per caso da un ragazzo con un amo (Asaro 2003).

Alcidae

Pulcinella di mare *Fratercula arctica*, Atlantic Puffin

4 es.

Uria nera *Cepphus grylle*, Black Guillemot
1 es. extra-italiano.

Gazza marina *Alca torda*, Razorbill
2 es.

Gazza marina minore *Alle alle*, Little Auk
1 es. extra-italiano.

Uria sp.
1 es. extra-italiano. Forse si tratta di un juv. di Uria di
Brunnich *Uria lomvia*, Thick-billed Murre.

STRIGIFORMES

Tytonidae

Barbagianni *Tyto alba*, Common Barn Owl
5 es.

Strigidae

Civetta *Athene noctua*, Little Owl
3 es.

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*, Boreal Owl
1 es. extra-italiano.

Assiolo *Otus scops*, Eurasian Scops Owl
3 es.

Gufo comune *Asio otus*, Northern Long-eared Owl
1 es.

Gufo di palude *Asio flammeus*, Short-eared Owl
5 es.

Allocco *Strix aluco*, Tawny Owl

1 es.

Gufo reale *Bubo bubo*, Eagle Owl

1 es. non siciliano.

ACCIPITRIFORMES

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*, Osprey

3 es.

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*, European Honey-buzzard

6 es., di cui 1 juv. morfismo chiaro, riportato da Sorci et al. (1973).

Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Aegyptian Vulture

2 es. immaturi (Sorci et al. 1973).

Biancone *Circaetus gallicus*, Short-toed Snake-eagle

3 es. Sorci et al. (1973) ne riportano solo 2, di cui 1 catturato nell'ottobre 1952.

Grifone *Gyps fulvus*, Griffon Vulture

1 es. catturato a Mazara del Vallo probabilmente negli anni '50 del secolo scorso (Franco Adamo, com. pers.).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*, Golden Eagle

1 es. ♀ catturato "alla montagna Tonda, presso Trapani" (probabilmente si tratta della Montagna Grande, sita vicino al Lago Rubino) il 10.VIII.1954 (Sorci et al. 1973); Asaro (2003), invece, lo riporta come catturato sulle

Madonie. La targhetta originaria conferma il sesso e la data riportati da Sorci et al. (1973), mentre la località di cattura non viene indicata.

Aquila minore *Hieraetus pennatus*, Booted Eagle

2 es. dal morfismo chiaro probabilmente di cattura extra-siciliana.

Circus sp.

1 es. di sesso indet. Forse si tratta di un'Albanella reale *Circus cyaneus*, Hen Harrier.

Falco di palude *Circus aeruginosus*, Western Marsh-harrier

5 es., di cui 1 ♂ e 4 ♀ ♀.

Albanella reale *Circus cyaneus*, Hen Harrier

3 es., di cui 2 ♂ ♂ e 1 di sesso indet.

Albanella pallida *Circus macrourus*, Pallid Harrier

2 es., di cui uno catturato il 6.IV.1948 (Sorci et al. 1973); la data di cattura di questo esemplare è confermata dalla targhetta originaria, su cui c'è anche riportata l'erronea identificazione come Falco di palude ♂. Sorci et al. (1973) ritenevano che il secondo esemplare fosse una ♀ juv., ma si tratta in realtà di un ♂ 2CY. Asaro (2003) riporta solo 1 esemplare (è probabile che ci sia stato un errore nelle identificazioni passate delle Albanelle; vd. Albanella minore).

Albanella minore *Circus pygargus*, Montagu's Harrier

4 es., di cui 1 juv., 1 ♂ e 2 di sesso indet. Sorci et al. (1973) riportano solo 1 ♀ e 1 ♂. Asaro (2003) riporta 1 ♂, 1 ♀ e un altro esemplare il cui sesso non è specificato; è possibile che quest'ultimo esemplare fosse in realtà una

delle 2 Albanelle pallide allora presenti nella collezione (Asaro (2003) infatti ne cita solo 1). Le altre 2 Albanelle minori attualmente presenti nel museo sarebbero entrate solo nel 2019 (donazione di Francesco Adragna); una di queste ultime ha nel tarso sinistro una struttura ad anello, forse legata al mondo della falconeria.

Sparviere *Accipiter nisus*, Eurasian Sparrowhawk

9 es. Sulla targhetta originaria di 3 esemplari è riportato il sesso: 2 ♂♂ e 1 ♀; uno dei 2 ♂♂ sembra immaturo, l'altro è adulto.

Astore *Accipiter gentilis*, Northern Goshawk

3 es., di cui 1 juv. e 2 immaturi; sulla targhetta originaria di uno di questi ultimi è scritto che si tratta di una ♀. Sono tutti di cattura extra-siciliana.

Nibbio reale *Milvus milvus*, Red Kite

2 es. Sulla targhetta originaria di 1 esemplare è scritto che si tratta di una ♀ (cfr. anche Asaro 2003).

Nibbio bruno *Milvus migrans*, Black Kite

2 es., di cui 1 immaturo.

Poiana *Buteo buteo*, Eurasian Buzzard

5 es. Sorci et al. (1973) elencano una sola poiana, che riportano come *Buteo buteo pojana*. Asaro (2003) ne riporta 3, ma 1 di questi esemplari, riprodotto in foto, appartiene alla ssp. *Buteo buteo vulpinus*, di cui sono presenti 2 esemplari (vd. sotto).

Poiana delle steppe *Buteo buteo vulpinus*, Steppe Buzzard

2 es.

Poiana codabianca *Buteo rufinus*, Long-legged Buzzard

1 es. extra-siciliano.

BUCEROTIFORMES

Bucerotidae

***Tockus* sp.**

1 es., probabilmente un Bucero beccogiallo orientale *Tockus flavirostris*, Eastern Yellow-billed Hornbill, o un Bucero beccogiallo meridionale *Tockus leucomelas*, Southern Yellow-billed Hornbill. Certamente di origine extra-italiana.

Upupidae

Upupa *Upupa epops*, Common Hoopoe

5 es.

CORACIIFORMES

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*, European Bee-eater

6 es.

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*, European Roller

5 es.

Alcedinidae

Martin pescatore *Alcedo atthis*, Common Kingfisher

6 es., di cui 1 catturato nel 1951.

Martin pescatore bianconero *Ceryle rudis*, Pied Kingfisher

1 es. extra-italiano.

PICIFORMES

Picidae

Torcicollo *Jynx torquilla*, Eurasian Wryneck
4 es.

Picchio verde *Picus viridis*, Green Woodpecker
2 es. non siciliani.

Picchio rosso minore *Dryobates minor*, Lesser Spotted Woodpecker
1 es. non siciliano.

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*, Great Spotted Woodpecker
6 es.

FALCONIFORMES

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*, Lesser Kestrel
4 es., di cui almeno 2 ♂♂ e 1 ♀.

Gheppio *Falco tinnunculus*, Common Kestrel
8 es. Sulla targhetta originaria di 2 esemplari è riportato che si tratta di ♀♀.

Falco cuculo *Falco vespertinus*, Red-footed Falcon
8 es., di cui 4 ♂♂ (tra cui 1 immaturo), 3 ♀♀ e 1 di sesso indet. Sorci et al. (1973) riportano 2 ♂♂ e 2 ♀♀.

Falco della regina *Falco eleonora*, Eleonora's Falcon
2 es.

Smeriglio *Falco columbarius*, Merlin

3 es. Sorci et al. (1973) riportano un solo esemplare, indicandolo come juv.

Lodolaio *Falco subbuteo*, Eurasian Hobby

4 es.

Lanario *Falco biarmicus*, Lanner Falcon

3 es. Sorci et al. (1973) riportano un solo esemplare, indicandolo come immaturo, e lo attribuiscono alla ssp. *Falco biarmicus feldeggii*.

Sacro *Falco cherrug*, Saker Falcon

1 es. Un altro era conservato presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani (Sorci et al. 1973), ma è andato disperso.

Falco pellegrino *Falco peregrinus*, Peregrine Falcon

5 es., di cui 4 appartengono probabilmente alla ssp. *Falco peregrinus brookei*. Sorci et al. (1973) ne riportano solamente 1 e lo attribuiscono alla ssp. *Falco peregrinus peregrinus*; questo esemplare, citato anche da Asaro (2003) senza specificare la sottospecie di appartenenza, è molto probabilmente uno dei 2 *Falco peregrinus calidus* presenti attualmente nel museo (in particolare la ♀ 2CY). Sulla targhetta originaria di 1 esemplare è scritto che si tratta di una ♀; su quella di un altro è riportato che si tratta di un ♂.

Falco pellegrino siberiano *Falco peregrinus calidus*, Siberian Peregrine Falcon

2 es., di cui 1 ♀ 2CY; sulla targhetta originaria dell'altro esemplare è scritto che si tratta di una ♀.

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*, Monk Parakeet
1 es.

Amazzone frontebliù *Amazona aestiva*, Turquoise-fronted Amazon
1 es. probabilmente di cattività.

Rosella comune *Platycercus eximius*, Eastern Rosella
1 es. probabilmente di cattività.

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*, Budgerigar
2 es. probabilmente di cattività.

PASSERIFORMES

Oriolidae

Rigogolo *Oriolus oriolus*, Eurasian Golden Oriole
10 es.

Laniidae

Averla cenerina *Lanius minor*, Lesser Grey Shrike
1 es.

Averla capirossa *Lanius senator*, Woodchat Shrike
4 es.

Corvidae

Gracchio corallino *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, Red-billed Chough
1 es.

Gazza aliazurre iberica *Cyanopica cooki*, Iberian Azure-winged Magpie
1 es. extra-italiano.

Ghiandaia *Garrulus glandarius*, Eurasian Jay
4 es.

Gazza *Pica pica*, Eurasian Magpie
3 es.

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*, Northern Nutcracker
1 es. non siciliano.

Taccola *Corvus monedula*, Eurasian Jackdaw
3 es.

Corvo comune *Corvus frugilegus*, Rook
2 es., di cui 1 immaturo catturato nel 1952 (Sorci et al. 1973) e 1 possibile adulto facente parte della donazione Adragna. Il Corvo comune era regolarmente svernante fino alla metà del secolo scorso; oggi è ritenuto accidentale in Sicilia.

Corvo imperiale *Corvus corax*, Common Raven
1 es.

Cornacchia grigia *Corvus corone cornix*, Carrion Crow
2 es.

Paridae

Cincia mora *Periparus ater*, Coal Tit

2 es.

Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*, Crested Tit
3 es. extra-italiani.

Cinciarella *Cyanistes caeruleus*, Blue Tit
1 es.

Cinciallegra *Parus major*, Great Tit
6 es.

Remizidae

Pendolino *Remiz pendulinus*, Eurasian Penduline Tit
1 es.

Alaudidae

Calandra *Melanocorypha calandra*, Calandra Lark
3 es.

Allodola *Alauda arvensis*, Eurasian Skylark
4 es., di cui 2 affetti da aberrazioni del colore, forse
“albinismo” o “diluizione” (cfr. van Grouw 2021).

Cappellaccia *Galerida cristata*, Crested Lark
4 es.

Acrocephalidae

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*, Great Reed-
warbler
1 es.

Hirundinidae

Rondine *Hirundo rustica*, Red-rumped Shallow

1 es.

Pycnonotidae

Bulbul orecchie bianche *Pycnonotus leucotis*, White-eared Bulbul
1 es. extra-italiano.

Phylloscopidae

Luì piccolo *Phylloscopus collybita*, Chiffchaff
2 es.

Scotocercidae

Usignolo di fiume *Cettia cetti*, Cetti's Warbler
1 es.

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*, Long-tailed Tit
2 es. non siciliani.

Sylviidae

Capinera *Sylvia atricapilla*, Eurasian Blackcap
3 es., di cui 1 ♂ e 2 ♀♀.

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*, Sardinian Warbler
2 es.

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*, Subalpine Warbler
1 es.

Magnanina *Sylvia undata*, Dartford Warbler
1 es.

Certhiidae

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*, Short-toed
Treecreeper
2 es.

Sittidae

Picchio muratore *Sitta europaea*, Eurasian Nuthatch
1 es.

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*, Wallcreeper
1 es. catturato il 26.X.1947 mentre si trovava su una
parete di tufo presso Mazara (Sorci et al. 1973); si tratta
di uno dei pochissimi reperti siciliani.

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*, White-throated Dipper
1 es.

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris*, Common Starling
5 es., di cui 1 affetto probabilmente da "albinismo" (forse
del tipo "Ino" oppure "Brown"; cfr. van Grouw 2021). Un
altro esemplare ha il becco anomalo, in quanto molto
allungato e curvato verso il basso: forse ciò è il risultato di
un trauma.

Storno nero *Sturnus unicolor*, Spotless Starling
1 es. Sulla targhetta originaria è scritto che si tratta di una
♀.

Storno collonero *Gracupica nigricollis*, Black-collared
Starling
1 es. extra-italiano.

Storno splendente purpureo *Lamprotornis purpureus*,
Purple Starling
1 es. extra-italiano.

Turdidae

Tordo dorato *Zoothera aurea*, White's Thrush
1 es. catturato da Silvio Manzo e Totino Burgio (S. Manzo,
com. pers.) a Mazara del Vallo, loc. Poggiallegro, il
9.XII.2001 (Corso 2005). Il Tordo dorato è una specie
accidentale in Italia (Baccetti et al. 2021).

Tordela *Turdus viscivorus*, Mistle Thrush
2 es.

Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, Song Thrush
11 es., di cui 2 affetti probabilmente da "albinismo" (forse
del tipo "Brown" oppure "Ino"; cfr. van Grouw 2021). 1
esemplare è provvisto di anello Ljubljana 192723YU; un
altro esemplare è stato catturato il 3.I.1976.

Tordo sassello *Turdus iliacus*, Redwing
3 es., di cui 1 catturato nel novembre del 1953.

Merlo *Turdus merula*, Eurasian Blackbird
2 es., di cui 1 ♂ e 1 ♀ catturati entrambi nel febbraio del
1953.

Cesena *Turdus pilaris*, Fieldfare
6 es., di cui 1 catturato nel dicembre del 1953 e 1 ♂
catturato il 12.IX.1950 e preparato da Saverio Mauro.

Merlo dal collare *Turdus torquatus*, Ring Ouzel
4 es. Sulla targhetta originaria di 1 esemplare è scritto che
si tratta di un ♂.

Muscicapidae

Pigliamosche *Muscicapa striata*, Spotted Flycatcher
2 es.

Pettirosso *Erithacus rubecula*, European Robin
2 es.

Pettazzurro *Cyanecula svecica*, Bluethroat
1 es., probabilmente appartenente alla ssp. *Cyanecula svecica cyanecula*.

Usignolo *Luscinia megarhynchos*, Common Nightingale
1 es.

Balia nera *Ficedula hypoleuca*, European Pied Flycatcher
1 es.

Balia dal collare *Ficedula albicollis*, Collared Flycatcher
1 es. ♂ catturato il 13.IV.1949.

Codiroso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*, Black Redstart
2 es.

Codiroso *Phoenicurus phoenicurus*, Common Redstart
2 es. ♂ ♂.

Codirossone *Monticola saxatilis*, Rufous-tailed Rock-thrush
3 es., di cui 1 ♂ e 2 ♀ ♀.

Passero solitario *Monticola solitarius*, Blue Rock-thrush
8 es.

Stiaccino *Saxicola rubetra*, Winchat

2 es.

Saltimpalo *Saxicola torquatus*, Common Stonechat

2 es.

Culbianco *Oenanthe oenanthe*, Northern Wheatear

2 es.

Monachella *Oenanthe hispanica*, Black-eared Wheatear

5 es.

Regulidae

Regolo *Regulus regulus*, Goldcrest

1 es.

Fiorrancino *Regulus ignicapilla*, Common Firecrest

1 es.

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*, Bohemian Waxwing

2 es. extra-italiani.

Prunellidae

Sordone *Prunella collaris*, Alpine Accentor

1 es.

Passera scopaiola *Prunella modularis*, Dunnock

3 es.

Estrildidae

Padra *Lonchura oryzivora*, Java Sparrow

1 es., probabilmente di cattività.

Taeniopygia sp.

1 es., probabilmente un Diamante mandarino australiano ♀; il piumaggio "anomalo" potrebbe indicare una varietà selezionata artificialmente.

Diamante mandarino australiano *Taeniopygia castanotis*, Australian Zebra Finch

1 es. ♂, probabilmente di cattività.

Viduidae

Vedova coda a spilli *Vidua macroura*, Pin-tailed Whydah

1 es. ♂ in abito riproduttivo, privo della caratteristica coda. Certamente di origine extra-italiana.

Passeridae

Passer sp.

1 es. affetto probabilmente da "albinismo" (forse del tipo "Brown" oppure "Ino"; cfr. van Grouw 2021), catturato nel 1971 e donato da Marascia. Possibilmente si tratta di *Passer italiae* x *hispaniolensis*.

Passer italiae* x *hispaniolensis

2 es., di cui 1 ♂ e 1 ♀.

Passera mattugia *Passer montanus*, Eurasian Tree Sparrow

2 es.

Passera lagia *Petronia petronia*, Rock Sparrow

1 es.

Motacillidae

Pispola golarossa *Anthus cervinus*, Red-throated Pipit
1 es.

Pispola *Anthus pratensis*, Meadow Pipit
1 es. catturato il 3.III.1935.

Cutrettola *Motacilla flava*, Western Yellow Wagtail
2 es.

Ballerina gialla *Motacilla cinerea*, Grey Wagtail
1 es.

Ballerina bianca *Motacilla alba*, White Wagtail
1 es.

Ballerina bianca britannica *Motacilla alba yarrellii*, Pied
Wagtail
1 es. probabilmente di cattura extra-siciliana.

Fringillidae

Fringuello *Fringilla coelebs*, Common Chaffinch
1 es.

Peppola *Fringilla montifringilla*, Brambling
1 es.

Frosone albianche *Mycerobas carnipes*, White-winged
Grosbeak
2 es. probabilmente di cattività.

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*, Hawfinch
3 es.

Frosone codanera *Eophona migratoria*, Chinese Grosbeak
1 es. probabilmente di cattività.

Ciuffolotto scarlatto di Pallas *Carpodacus roseus*, Pallas's
Rosefinch
1 es. probabilmente di cattività.

Ciuffolotto delle pinete *Pinicola enucleator*, Pine
Grosbeak
1 es. extra-italiano.

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*, Eurasian Bullfinch
2 es., di cui 1 probabilmente di cattura extra-siciliana.
L'altro esemplare ha un anello identificativo messo da
pulcino, che indica l'origine da allevamento.

Verdone *Chloris chloris*, European Greenfinch
1 es.

Fanello nordico *Linaria flavirostris*, Twite
1 es. extra-italiano.

Fanello *Linaria cannabina*, Common Linnet
2 es.

Organetto *Acanthis flammea*, Redpoll
1 es. extra-italiano.

Crociere *Loxia curvirostra*, Red Crossbill
5 es., di cui 1 ♂ e 1 ♀ catturati nel 1935 (Sorci et al.
1973). A parte la popolazione sedentaria sull'Etna,
periodicamente giungono in Sicilia individui nordici, che
possono fermarsi anche alcuni anni (Massa et al. 2021).

Cardellino *Carduelis carduelis*, European Goldfinch

3 es.

Canarino domestico *Serinus canaria* forma domestica,
Domestic Canary

2 es.

Lucherino *Spinus spinus*, Eurasian Siskin

3 es.

Calcariidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*, Snow Bunting

1 es.

Emberizidae

Zigolo testaranciata *Emberiza bruniceps*, Red-headed
Bunting

1 es. extra-italiano.

Strillozzo *Emberiza calandra*, Corn Bunting

4 es.

Zigolo muciatto *Emberiza cia*, Rock Bunting

1 es.

Zigolo nero *Emberiza cirulus*, Cirl Bunting

2 es.

Icteridae

***Molothrus* sp**

1 es. Forse si tratta di un Vaccaro urlatore *Molothrus rufoaxillaris*, Screaming Cowbird, o di un Vaccaro splendente *Molothrus bonariensis*, Shiny Cowbird. Certamente di origine extra-italiana.

Thraupidae

Cardinale ciufforosso *Paroaria coronata*, Red-crested Cardinal

1 es. probabilmente di cattività.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare Franco Adamo e Silvio Manzo per il grande supporto che ci hanno dato durante la stesura di questo catalogo; inoltre ci teniamo a ringraziare sentitamente tutti gli esperti che, seppur “a distanza”, ci hanno dato un aiuto prezioso nell’identificazione di alcuni esemplari, tra cui: Andrea Corso per aver identificato il Pellicano comune, 1 Albanella reale, le 2 Albanelle pallide, 3 Albanelle minori (escluso il ♂), i 2 Falchi pellegrini siberiani e per aver provato a identificare tutti gli altri Falchi pellegrini a livello di sottospecie e l’*Uria* sp. a livello di specie; Ottavio Janni per aver confermato l’identificazione del Bulbul orecchie bianche, dello Storno collonero, del Padda, della *Taeniopygia* sp., della Vedova coda a spilli, del Frosone alibianche, del Canarino domestico e per aver provato a identificare l’*Uria* sp., il *Tockus* sp. e l’Icteride a livello di specie; Alvaro Jaramillo per aver provato a identificare l’Icteride a livello di specie; Alex Boldrini per aver identificato il Gabbiano reale nordico. Infine ringraziamo Francesco Micheloni per averci suggerito la tipologia di anello presente in un esemplare di Ciuffolotto e Renzo Ientile per alcuni utili suggerimenti durante la stesura del testo. Le fotografie di alcuni esemplari e delle vetrine sono di Michele Milazzo, che ringraziamo sinceramente.

Bibliografia

- Asaro S., 2003. Guida al Museo Ornitologico. *Città di Mazara del Vallo, Assessorato alla Cultura, Mazara del Vallo*.
- Baccetti N., Fracasso G. & C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. *Avocetta*, 45 (1): 21-85.
- Corso A., 2005. Avifauna di Sicilia. *L'Epos*, Palermo.
- van Grouw H., 2021. What's in a name? Nomenclature for colour aberrations in birds reviewed. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 141 (3): 276-299.
- HBW & BirdLife International, 2020. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Ver. 5. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v5_Dec20.zip
- Hopps V., 1968. Un Cuculo col ciuffo in Sicilia. *Diana - Rivista del Cacciatore*, 11: 66.
- Lo Valvo F. & Massa B., 1999. Lista commentata dei vertebrati terrestri della Riserva Naturale Orientata "Isole dello Stagnone" (Sicilia). *Il Naturalista siciliano*, 23 (3-4): 419-466.
- Massa B., Borg J. J. & Tagliavia M., 2022. Some comments on *Passer italiae*-like of south Italy, Sicily and Malta. *Rivista Italiana di Ornitologia*, 92 (1): 13-22.
- Massa B., lentile R., Aradis A. & Surdo S., 2021. One hundred and fifty years of ornithology in Sicily, with an unknown manuscript by Joseph Whitaker. *Biodiversity Journal*, 12 (1): 27-89.
- Massa B., Lo Cascio P., lentile R., Canale E. D. & La Mantia T., 2015. Gli uccelli delle isole circumsiciliane. *Il Naturalista siciliano*, 39 (2): 105-373.
- Moltoni E., 1970. Gli uccelli ad oggi riscontrati nelle Isole Linosa, Lampedusa e Lampione (Isole Pelagie, Canale

di Sicilia, Mediterraneo). *Rivista italiana di Ornitologia*, 40 (2): 77-283.

Sorci G., Massa B. & Cangialosi G., 1971. Il genere *Stercorarius* Brisson è regolare nel Mediterraneo. *Rivista italiana di Ornitologia*, 41 (3): 161-198.

Sorci G., Massa B. & Cangialosi G., 1973. Avifauna delle Isole Egadi con notizie riguardanti quella della provincia di Trapani (Sicilia). *Rivista italiana di Ornitologia*, 43 (1): 1-119.

In aggiunta alla collezione ornitologica, il Museo ha anche un piccolo lotto di esemplari di Mammiferi e Rettili, che elenchiamo di seguito.

MAMMALIA

Note metodologiche. La sistematica di riferimento è quella usata da Loy et al. (2019); nel caso specifico dell'*Eudorcas* sp. e del Wallaby dal collo rosso sono stati seguiti rispettivamente i lavori di Kingdon & Hoffmann (2013) e di Jackson & Groves (2015).

Lista sistematica dei taxa presenti nel museo

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Wallaby dal collo rosso continentale *Notamacropus rufogriseus banksianus*, Australian mainland Red-necked Wallaby
1 es. extra-italiano.

ERINACEOMORPHA

Erinaceidae

Riccio siciliano *Erinaceus europaeus consolei*, Sicilian Hedgehog
1 es.

SORICOMORPHA

Soricidae

Crocidura di Sicilia *Crocidura sicula*, Sicilian Shrew

1 es.

CARNIVORA

Canidae

Volpe comune *Vulpes vulpes*, Red Fox

1 es.

Felidae

Gatto selvatico europeo *Felis silvestris*, European Wild Cat

1 es. catturato sulle Madonie nel 1979 e donato dagli Avv.ti Evola, Marano e Redini (come indicato dalla targhetta originaria).

Mustelidae

Faina *Martes foina*, Stone marten

1 es. Questa specie non è presente in Sicilia.

Tasso *Meles meles*, European Badger

1 es. Ha una targhetta ove è scritto: Provincia di Bergamo - L.R. 42/86 - n° 001.909. Questa specie non è presente in Sicilia.

Donnola *Mustela nivalis*, Least Weasel

1 es.

Furetto *Mustela furo*, Ferret

1 es. Attorno al collo vi è un laccio da cui pendono tre campanelle.

Viverridae

Genetta sp.

1 es. ♀ catturato a Mazara il 3.III.1939 e preparato da Saverio Mauro (come indicato nel supporto su cui è stato montato

l'esemplare); era scappato da un circo (Asaro 2003), ed è stato abbattuto da Vito Lentini (Franco Adamo, com. pers.). Si tratta possibilmente di una Genetta comune *Genetta genetta*, Common Genet.

CETARTIODACTYLA

Bovidae

***Eudorcas* sp.**

1 es. extra-italiano, rappresentato da un paio di corna, tracce di pelle e peli. Si tratta probabilmente di una Gazzella di Heuglin *Eudorcas tilonura*, Heuglin's Gazelle, o di una Gazzella dalla fronte rossa *Eudorcas rufifrons*, Red-fronted Gazelle.

Camoscio alpino *Rupicapra rupicapra*, Alpine Chamois

1 es. ♂ probabilmente di origine alpina, rappresentato da un paio di corna ancora attaccate a una piccola porzione di cranio.

Cervidae

Capriolo *Capreolus capreolus*, European Roe Deer

2 es. ♂♂. Uno è rappresentato da entrambi i palchi ancora attaccati a una piccola porzione di cranio, l'altro dai palchi e dall'intero cranio, a cui manca solo la mandibola. I palchi dell'esemplare privo di gran parte del cranio hanno forma anomala, forse a causa di una disfunzione ormonale o di traumi. Questa specie non è presente in Sicilia.

Suidae

Cinghiale *Sus scrofa*, Wild Boar

1 es. juv.

RODENTIA

Hystriidae

Istrice *Hystrix cristata*, Crested Porcupine

1 es. juv.

Sciuridae

Scoiattolo meridionale *Sciurus meridionalis*, Calabrian

Black Squirrel

1 es. Questa specie non è presente in Sicilia.

Scoiattolo comune *Sciurus vulgaris*, Eurasian Red Squirrel

2 es. Questa specie non è presente in Sicilia.

LAGOMORPHA

Leporidae

Lepre appenninica *Lepus corsicanus*, Apennine Hare

3 es., di cui 1 juv. e 1 preparato da Marascia.

Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*, Wild Rabbit

1 es.

REPTILIA

Note metodologiche. La sistematica di riferimento è quella usata da Sindaco & Razzetti (2021); nel caso specifico

dell'*Uromastyx* sp. è stato seguito il lavoro di Wilms et al. (2009).

Lista sistematica dei taxa presenti nel museo

TESTUDINES

Emydidae

Testuggine palustre americana *Trachemys scripta*, Pond Slider

1 es. probabilmente di cattività. Appartiene probabilmente alla ssp. *Trachemys scripta elegans*.

SQUAMATA

Agamidae

***Uromastyx* sp.**

1 es. extra-italiano. Molto probabilmente si tratta di un Uromastice acantinuuro *Uromastyx acanthinura*, North African Spiny-tailed Lizard.

Ringraziamenti

Ci teniamo a ringraziare sentitamente gli esperti che, seppur “a distanza”, ci hanno dato un aiuto prezioso nell’identificazione degli esemplari: Spartaco Gippoliti, che ha identificato l’*Eudorcas* sp., e Francesco Maria Angelici, che ha identificato tutti gli altri Mammiferi e i Rettili.

Bibliografia

- Asaro S., 2003. Guida al Museo Ornitologico. *Città di Mazara del Vallo, Assessorato alla Cultura*, Mazara del Vallo.
- Jackson S. & Groves C., 2015. Taxonomy of Australian mammals. *CSIRO Publishing*, Clayton South, Victoria.
- Kingdon J. & Hoffmann M., 2013. Mammals of Africa. Volume VI: Pigs, Hippopotamuses, Chevrotain, Giraffes, Deer and Bovids. *Bloomsbury Publishing*, London.

- Loy A., Aloise G., Ancillotto L., Angelici F. M., Bertolino S., Capizzi D., Castiglia R., Colangelo P., Contoli L., Cozzi B., Fontaneto D., Lapini L., Maio N., Monaco A., Mori E., Nappi A., Podestà M., Russo D., Sarà M., Scandura M. & Amori G., 2019. Mammals of Italy: an annotated checklist. *Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy*, 30 (2): 87-106.
- Sindaco R. & Razzetti E., 2021. An updated check-list of Italian amphibians and reptiles. *Natural History Sciences*, 8 (2): 35-46.
- Wilms T. M., Böhme W., Wagner P., Lutzmann N. & Schmitz A., 2009. On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - Resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zoologische Beiträge*, 56 (1/2): 55-99.

*ALCUNE VETRINE
DELLA SALA PRINCIPALE
DEL MUSEO*







***ALCUNI TRA GLI ESEMPLARI
PIÙ RARI DEL MUSEO***



Gallina prataiola *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)



Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)



Gobbo rugginoso *Hoxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)



Quattrocchi *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758)



Succiacapre isabellino *Caprimulgus aegyptius*
(Lichtenstein, 1823)



Tordo dorato *Zosterops lateralis* (Hollandre, 1825)



Corrione biondo *Cursorius cursor* (Latham, 1787)

Foto di Michele Milazzo

