

SALVATORE BAGLIERI & FLAVIO FAGOTTO

ACCERTATA LA SOPRAVVIVENZA DEL GUFO REALE
(*BUBO BUBO* [L.]) IN SICILIA
(*Aves, Strigiformes*)

RIASSUNTO

Viene data notizia dell'accertamento dell'esistenza di una coppia di Gufi reali in provincia di Siracusa, nell'alta valle dell'Anapo. Sono pure riportate alcune notizie bibliografiche sulla presenza della specie in Sicilia, ove ormai era generalmente ritenuta scomparsa.

SUMMARY

Confirmation of the presence of Eagle Owl in Sicily. The writers point out the presence of Eagle Owl in the high valley of the Anapo river (Syracuse, Sicily). The species had been considered extinct in Sicily.

Durante uno studio svolto nel 1978 sulla vegetazione e l'avifauna dell'Alta valle dell'Anapo (Siracusa) abbiamo rilevato con certezza la presenza del Gufo reale (*Bubo bubo* [L.]), grosso Strigiforme del quale mancavano notizie per la Sicilia da quasi 15 anni e per la provincia di Siracusa da oltre 25 anni.

Abbiamo udito il caratteristico ed inconfondibile possente richiamo del Gufo reale in due occasioni, all'imbrunire del 6 maggio e del 20 maggio 1978. Nel primo caso era, come sempre, compagno della nostra escursione il Prof. V. Impallomeni, nel secondo anche il collega B. Massa, sempre sensibile agli appuntamenti ornitologici.

Riteniamo che almeno una coppia sia presente nella valle, in quanto il richiamo ci è giunto simultaneo da due luoghi diversi.

Le notizie sulla presenza regolare di questo rapace notturno nei distretti di Modica e Siracusa risalgono al GIGLIOLI (1890) ed al RIERA (1923) e sono riferite proprio alle vallate aspre, profonde e ricche di vegetazione della catena degli Iblei. L'ultima segnalazione certa risale al 1950 circa e riguarda il bosco di Sortino (Siracusa). Per quanto concerne le altre zone della Sicilia, il Gufo reale, ritenuto regolarmente presente da tutti i vecchi autori, è andato via via diminuendo nel tempo. DODERLEIN (1869) lo riteneva relativamente abbondante a Mt. Pellegrino (Palermo), ORLANDO (1957) lo considerava raro in Sicilia, e KRAMPITZ (1958) scriveva che dal 1932 si erano avuti solo 7 accertamenti nell'Isola. PRIOLO (1972) ci dà le ultime notizie: una cattura nel XI.54 presso Enna ed una nel VI.64 nei boschi di Miraglia (Cesarò, Messina).

È opportuno però a questo punto ricordare le difficoltà di localizzare questa specie, che ha abitudini profondamente notturne e che fa udire il suo richiamo d'amore soprattutto in autunno e inverno fino all'inizio della primavera, raramente dopo.

BIBLIOGRAFIA

- DODERLEIN P., 1869 — Avifauna del Modenese e della Sicilia. — *Giorn. Sci. Nat. Econom.* (Palermo) V: 1-381.
- GIGLIOLI H., 1890 — Primo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Parte II, avifaune locali. — Succ. Le Monnier, Firenze.
- KRAMPITZ H. E., 1958 — Weiteres über die Brutvögel Siziliens. — *J. Ornithol.*, 99: 39-58.
- ORLANDO C., 1957 — Contributo allo studio delle forme europee del *Bubo bubo* (L.). — *Riv. It. Ornitol.*, XXVII: 42-53.
- PRIOLO A., 1972 — Brevi note ornitologiche dalla Sicilia orientale. — *Riv. It. Ornitol.*, XLII: 430-434.
- RIERA E., 1923 — Note sugli uccelli osservati nella provincia di Siracusa. — *Riv. It. Ornitol.*, VII: 8-17.

Nota presentata nella riunione scientifica del 3.VII.1978

Indirizzo degli Autori — SALVATORE BAGLIERI - C.so Timoleonte, 125 - 96100 Siracusa.
FLAVIO FAGOTTO - Via Torino ang. V.le Teocrito - 96100 Siracusa.