

IL MARTIN PESCATORE, *Alcedo atthis*, NIDIFICA IN SICILIA

ABSTRACT. — *Nesting of the Kingfisher, Alcedo atthis, in Sicily.*

Sebbene tutti i vecchi Autori considerino il Martin pescatore, *Alcedo atthis*, nidificante in Sicilia, non sono state mai fornite delle prove di nidificazione. Infatti, tale specie non viene inclusa tra quelle nidificanti certe in Sicilia da tutti quegli Autori che più recentemente si sono interessati all'avifauna dell'isola (cfr. BRICHETTI & CAMBI, 1981; MASSA & SCHENK, 1983; BRICHETTI & MASSA, 1984; CRAMP, 1985). Inoltre, nell'Atlante Ornitologico Siciliano (MASSA, Red., 1985) il Martin pescatore viene incluso tra le specie nidificanti probabili.

Il 30-III-1985 in un fossato lungo ca. 80 m, a ridosso di un agrumeto, a poche decine di metri dal canale Buttaceto nel territorio della Riserva Naturale della foce del Simeto (Catania), su una parete sabbiosa del fossato stesso, a circa 1,5 m da terra, ho osservato alcuni fori (4-5) davanti ai quali, su una radice sporgente, stava posato un Martin pescatore; le abbondanti colate di feci sotto il foro d'ingresso al nido testimoniavano come il posatoio fosse frequentato da tempo. Successivamente l'ho notato entrare in uno dei fori dal quale è uscito dopo pochi minuti. Durante altre visite, non ho notato però alcuna presenza di Martin pescatori nel fossato. Il 27-IV trovavo, sotto il nido, la carcassa ormai rinsecchita della femmina insieme ai resti di un uovo ed alcune borre. Probabilmente il fallimento della nidificazione è stato causato dal parziale franamento della parete sabbiosa in seguito a lavori agricoli nell'agrumeto.

Ho osservato, comunque, altri Martin pescatori nel comprensorio della foce del Simeto durante i mesi estivi, che dovrebbero essersi riprodotti, e precisamente: 8-VI, 2 ind. insieme nei pressi della foce del Buttaceto; 15-VI, 2 ind. osservati in località diverse, uno dei quali volò da uno strettissimo fossato vicino alla vecchia ansa del Simeto dove vi era un tunnel parzialmente costruito.

In poche altre località siciliane viene segnalata la possibile nidificazione del Martin pescatore. Tra queste, di particolare interesse, la confluenza del Simeto con il Dittaino, dove ho frequentemente osservato la specie nei mesi estivi; il Lago Pozzillo di Regalbuto (Enna): 1 ind. 22-VI-1985, successivamente notato anche da M. Sarà (*com. pers.*); le Saline di Siracusa dove significative osservazioni estive sono state fatte da C. Iapichino nell'85 e pressochè annualmente nel periodo riproduttivo; il Biviere di Gela (Caltanissetta) dove la specie è presente tutto l'anno (*Dimarca com. pers.*).

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1981-82 - Uccelli. Enciclopedia sistematica dell'avifauna italiana - *Rizzoli*, Milano.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1984 - Check-list degli uccelli italiani - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 54: 3-37.
- CRAMP S. (ed.), 1985 - The Birds of the Western Palaearctic, Vol. IV - *Oxford University Press*, Oxford, 960 pp.
- MASSA B. (Red.), 1985 - Atlante degli uccelli nidificanti in Sicilia (1979-83) - *Suppl. Naturalista siciliano*.

Via Enna 15/A, 95128 Catania.

ANDREA CIACCIO

Riv. ital. Orn., Milano, 56 (1-2): 109-111, 15-VI-1986

INTERESSANTI AVVISTAMENTI NELL'AREA GARDESANA

ABSTRACT. — *Interesting ornithological sightings on the Lake Garda and neighbouring areas (NE Italy).*

The author points out the first case of summering of *Phalacrocorax carbo sinensis* on the Lake Garda, recorded in 1985, and makes remarks concerning some individuals of *Cygnus olor* in the winter 1984-85 and of *Calidris alba* in September 1985. Mention is also made of three *Tetrax tetrax*, observed respectively in November 1984, in March and in December 1985, in the inland of the lake basin. Concerning the last species, the A. assumes that they may have come from Western areas, probably from France.

Ritengo utile notificare alcune segnalazioni ornitologiche inerenti l'area gardesana e raccolte nel biennio 1984-85. Esse si riferiscono a specie di comparsa rara, quanto meno a livello locale e provinciale, o ad aspetti nuovi circa la fenologia nel territorio considerato.

Cormorano, *Phalacrocorax carbo sinensis*: il Garda costituisce da tempo per questa specie un ricorrente sito di svernamento; tale circostanza, abbastanza nota sin dal secolo scorso, è stata riportata in termini più o meno generici da vari autori (ARRIGONI DEGLI ODDI 1904 e 1929, DUSE 1936, DUSE & CAMBI 1980, BRICHETTI & CAMBI 1981, BRICHETTI 1982 a, b). In tempi recenti, va riferita in particolare ad una cospicua colonia abitualmente stanziata nei