

BREVE NOTA

STEFANIA D'ANGELO & GIOVANNI GUADAGNA

ACCERTATA NIDIFICAZIONE DEL GERMANO REALE,
ANAS PLATYRHYNCHOS, NEL LAGO DI PIANA DEGLI ALBANESE
(Sicilia) (*Aves: Anseriformes*)

Confirmed breeding of the Mallard in the reservoir of Piana degli Albanesi (Sicily).

Il Germano reale (*Anas platyrhynchos*) è una grossa anatra di superficie a distribuzione oloartica. In Italia è nidificante in gran parte delle zone umide pianeggianti e lungo i fiumi anche se nel centro-sud è più localizzato (Prigioni e Boano in BRICHETTI *et alii*, 1992). In Sicilia il Germano reale è una specie in lieve aumento come nidificante ed in notevole incremento come svernante negli ultimi anni (IAPICHINO & MASSA, 1989; IAPICHINO, 1993; LO VALVO *et alii*, 1993); in passato era tuttavia molto più diffuso (DODERLEIN, 1869-74). Attualmente sono segnalati pochissimi casi di nidificazione prevalentemente nella Sicilia sud-orientale in laghetti e stagni con fitta vegetazione palustre. Nessun caso di nidificazione è mai stato segnalato per il lago artificiale di Piana degli Albanesi.

L'area di nidificazione è una piccola ansa inondata a causa delle abbondanti piogge dell'inverno 93-94. Il luogo non è caratterizzato da una vegetazione particolarmente fitta, ma possiede nella parte centrale, in prossimità di un ruscellamento, un piccolo gruppo di salici che si presentavano in primavera parzialmente sommersi. L'altezza massima dell'acqua era di circa un metro. Il 27.2.94 erano state viste nel lago 5 coppie di Germano reale già formate ed isolate dagli altri anatidi presenti nel bacino (La Mantia *com. pers.*). Il 21.5.94 osservavamo, nell'ansa sopra citata, un gruppo di 5 ♀♀ e poco dopo una ♀ con 4 pulli. Sempre nella stessa ansa erano presenti 4 Folaghe (*Fulica atra*) in atteggiamento spiccatamente territoriale ed un Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*). Il 29.5 veniva invece osservata nello stesso posto una ♀ di Germano reale con 12 pulli di dimensioni sensibilmente maggiori rispetto ai precedenti. È da ritenere pertanto che abbiano nidificato almeno due coppie. In un'ansa vicina vi erano inoltre 4 Folaghe e 6 ♂♂ e 3 ♀♀ di Germano reale. Il 25.7 l'area di nidificazione era quasi totalmente prosciugata e nessuna anatra veniva osservata, mentre nell'ansa vicina vi erano 4 Folaghe ed uno Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*) in abito riproduttivo. In tutto il lago e per l'intero periodo di osservazione erano presenti parecchi individui di Gabbiano reale (*Larus cachinnans*) (fino a 53 il 25.7).

Il Germano reale meno di altre specie risente delle alterazioni ambientali e frequenta spesso i bacini artificiali. Sebbene possa vivere in prossimità dell'uomo, è molto sensibile al disturbo antropico ed è attivamente cacciato in tutta Italia (Prigioni e Boano in BRICHETTI *et alii*, 1992). Il lago di Piana degli Albanesi, gestito dall'Enel, è stato da alcuni anni dichiarato fondo chiuso e quindi

bandito all'attività venatoria; queste sono le prime segnalazioni di nidificazione (dopo la chiusura della caccia) nonostante l'intero bacino sia soggetto a forti dislivelli idrici per i prelievi che servono l'acquedotto di Palermo.

Ringraziamenti. — Desideriamo ringraziare Bruno Massa, per l'attenzione ed i suggerimenti forniti nella preparazione della presente nota.

BIBLIOGRAFIA

— BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P., BACCETTI N. (red.), 1992, Fauna d'Italia. Uccelli I (Gaviidae - Phasianidae). - *Calderini*, Bologna. — DODERLEIN P., 1869-74, Avifauna del Modenese e della Sicilia. - *Giorn. Sci. nat. econom.*, 5-10. — IAPICHINO C. (red.), 1993, Rapporto Ornitologico Sicilia 1987-89. - *Naturalista sicil.*, 17: 149-168. — IAPICHINO C. & MASSA B., 1989, The Birds of Sicily. - *British Ornithologists' Union*, London. — LO VALVO M., MASSA B., SARÀ M. (red.), 1993, Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio. - *Naturalista sicil.*, XVII (Suppl.): 1-373.

Indirizzo degli Autori. — STEFANIA D'ANGELO, corso VI Aprile, 139 - 91011 Alcamo (TP) (I); GIOVANNI GUADAGNA, via Agrigento, 19 - 90141 Palermo (I).