

ACCERTATA NIDIFICAZIONE DI CODIROSSONE (*Monticola saxatilis* L.) IN SICILIA

Confirmed breeding of Rock Thrush Monticola saxatilis (L.) in Sicily.

La nidificazione del Codirossone non era nota fino ad oggi per la Sicilia (1, 2). Negli ultimi dieci anni erano state effettuate osservazioni che avevano fatto nascere il sospetto della « possibilità » di nidificazione in zone d'alta quota delle Madonie, e precisamente: 1) 2-VI-72 un ♂ adulto con comportamento territoriale tra Polizzi Generosa e Monte Mufara (m 1500 circa s.l.m.) (A. Priolo, *in verbis*); 2) 3-VIII-75, un ♂ adulto su Pizzo Carbonara (m 1700 circa s.l.m.) (A. Priolo, *in verbis*). 3) 29-V-77, 3 ♀ ♀ tra loro distanti 400-500 metri con comportamento territoriale in località « Madonna dell'Alto » (m 1800 circa s.l.m.) (B. Massa, *in verbis*). Durante alcuni censimenti di uccelli effettuati nel 1982 sull'Etna ho raccolto le prime prove di nidificazione di questa specie. Il 15-VI-82 una coppia di adulti con atteggiamento fortemente territoriale era presente in una piccola valletta presso Piano Provenzana, al limite della pineta a Pino Laricio di Linguaglossa (m 1780 s.l.m.). Il 16-VI-82 il comportamento della coppia era immutato; a circa 700-800 metri in una valletta simile alla precedente vi era un'altra femmina in atteggiamento territoriale (Lo Valvo e Massa). Il 17-VI-82 la coppia era ancora presente, il ♂, sempre in posatoi fissi, mostrava un'imbeccata che però per diffidenza non portò al nido (Ciaccio, Lo Valvo, Massa); il 19-VI-82 veniva osservata la ♀ che portava l'imbeccata al nido, situato in un buco inaccessibile (A. Priolo). Infine il 27-VI-82 la coppia era ancora nello stesso sito, mostrava ancora atteggiamenti territoriali, ma non sono stati osservati giovani nei dintorni (Ciaccio, La Mantia, Massa, Priolo).

Ritengo che, benché molto localizzato in zone d'alta quota, il Codirossone sia sempre stato nidificante in Sicilia e certamente si riproduce, oltre che sull'Etna, anche nelle Madonie. La stessa osservazione del Minà (in 3) di un individuo in estate sopra Castelbuono (loc. Monticelli, circa m 1.600 s.l.m.) potrebbe essere riferita ad un possibile nidificante.

Ringrazio vivamente l'Ing. Angelo Priolo di Catania e il Prof. Bruno Massa di Palermo per la collaborazione prestatami.

BIBLIOGRAFIA

(1) BRICHETTI P., 1978 - Guida degli Uccelli nidificanti in Italia. *F.lli Scalvi ed.*, Brescia, pp. 95 / (2) MASSA B., SCHENK H., *in stampa* - Similarità tra le avifaune della Sicilia, Sardegna e Corsica. *Lavori Soc. ital. Biogeogr.*, Forlì / (3) DODERLEIN P., 1869-1874 - Avifauna del Modenese e della Sicilia. *G. Sci. nat. econ.*, Palermo, V: 1-317 - 318-381.

Nota presentata nella riunione scientifica del 10.XII.1982

MARIO LO VALVO, Viale Regione Siciliana, 4468 - 90145 Palermo.

Naturalista sicil., S. IV, VII (1-4), 1983